

AHK-Cu

Alanyl-Histidyl-Lysine · complexe cuivre

Qu'est-ce que c'est ?

L'AHK-Cu est un tripeptide alanine-histidine-lysine complexé au cuivre, très proche du GHK-Cu dont il ne diffère que par le premier acide aminé. Ce changement modifie son affinité et oriente les travaux qui le concernent vers le follicule pileux plutôt que vers la matrice cutanée.

Ce qu'étudie la recherche

La recherche disponible porte principalement sur la vascularisation du follicule et sur les facteurs de croissance associés à la phase de croissance du cheveu.

Reconstitution — référence de laboratoire

Utiliser de l'eau bactériostatique et une seringue graduée stérile. Laisser couler le solvant le long de la paroi, sans agiter : l'agitation dégrade le peptide.

Eau ajoutée	Concentration obtenue	Repère seringue (100 UI)
1 mL	10 mg/mL	10 UI = 1 mg
2 mL	5 mg/mL	20 UI = 1 mg
3 mL	3,3 mg/mL	30 UI = 1 mg

Flacon de 10 mg. Conserver à l'abri de la lumière, comme le GHK-Cu.

Conservation

Poudre lyophilisée : 24 mois à 4 °C, flacon fermé, à l'abri de la lumière.

Après reconstitution : 2 mois à 2–8 °C. Ne jamais congeler la solution.

Questions fréquentes

Pourquoi si proche du GHK-Cu ?

Les deux appartiennent à la même famille de peptides cuivrés. Un acide aminé de différence suffit à changer la cible étudiée.

Même conservation que le GHK-Cu ?

Oui : 24 mois fermé à 4 °C, 2 mois à 2–8 °C une fois reconstitué, à l'abri de la lumière.

Les deux se combinent-ils ?

C'est une association qu'on retrouve dans la littérature sur le cuir chevelu, les deux voies étudiées étant complémentaires.

Erreurs fréquentes de manipulation

Agiter le flacon pour dissoudre

L'agitation casse la chaîne peptidique. Faire rouler doucement le flacon entre les mains et laisser le temps au produit de se dissoudre seul.

Injecter le solvant droit sur la poudre

Le jet direct dégrade le gâteau lyophilisé. Diriger l'aiguille contre la paroi de verre et laisser le liquide couler.

Confondre les mg et les mL

Les mg sont la quantité de produit, les mL le volume de solvant. Une même quantité dans deux volumes différents donne deux concentrations différentes.

Congeler la solution reconstituée

La formation de cristaux dégrade le peptide. Après reconstitution : réfrigérateur uniquement, entre 2 et 8 °C.

Laisser le flacon à la lumière

Plusieurs peptides sont photosensibles. Conserver à l'abri de la lumière, y compris avant reconstitution.

Lire un certificat d'analyse

Un certificat (COA) n'a de valeur que s'il porte le **nom du laboratoire** et une **date**. Le numéro de lot doit correspondre à celui de l'étiquette du flacon : c'est le seul lien entre le document et le produit que vous avez en main.

La **pureté** est mesurée par HPLC et s'exprime en pourcentage de la surface des pics. L'**identité** de la molécule, elle, se confirme par spectrométrie de masse : un COA sérieux comporte les deux.

Ce qu'un COA ne dit pas : ni la stérilité, ni l'absence d'endotoxines. Ce sont des analyses distinctes, qui ne se déduisent pas d'un chiffre de pureté.

Document fourni à titre informatif pour la recherche en laboratoire uniquement. Les produits Valeor Peps sont destinés exclusivement à la recherche scientifique in vitro et au développement : ce ne sont pas des médicaments et ils ne sont pas destinés à un usage humain, vétérinaire, alimentaire, cosmétique ou thérapeutique. Aucune information de ce document ne constitue un avis médical.